

ยาที่ควรระวังในผู้ที่แพ้ Sulfonamide

ยากลุ่มอื่นที่มีสูตรโครงสร้างทางเคมีที่คล้ายคลึงกันกับยากลุ่ม Sulfonamide ควรเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ยาเหล่านี้ เพื่อประโยชน์และเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยาของผู้ป่วย ดังนั้นจึงขอแนะนำยาที่ควรระมัดระวังในการใช้ในผู้ที่แพ้ Sulfonamide ดังตารางข้างล่างนี้

กลุ่มยา	ชื่อยา
ยาปฏิชีวนะ (Antimicrobial)	Silver sulfadiazine (Silverol®) Sodium sulfacetamide (Cetasil ED®) Sulfamethizole (Luco-oph®) Sulfamethoxazole (Bactrim®) Dapsone
ยาขับปัสสาวะกลุ่ม Carbinic anhydrase inhibitors ที่ใช้รักษาต้อหิน (Glaucoma)	Acetazolamide (Diamox®) Methazolamide (Neptazane®)
ยาขับปัสสาวะกลุ่ม Loop diuretics	Chlorthalidone (Tenoret®) Hydrochlorothiazide (HCTZ) Indapamide (Natrlix®) Furosemide (Lasix®)
ยารักษาเบาหวาน (Hypoglycemic agents, oral)	Acetohexamide Chlorpropamide (Diabinese®) Glipizide (Minidiab®) Glibenclamide (Daonil®) Tolbutamide
ยากลุ่มอื่น ๆ เช่น ยาแก้ปวดข้อ	Sulfasalazine (Salazopyrin EN®) Celecoxib (Celebrex®)

เอกสารอ้างอิง ปวีณา สนธิสมบัติ. Current Issues of Penicillin and Sulfa Drugs Allergy and Management. ใน: บุษบา จินดา
วิจักษณ์, บรรณาธิการ. การบริหารทางเภสัชกรรมเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย. กรุงเทพฯ: ประชาชน, 2547: 197-200.