

ยาที่ไม่ควรให้ทางสายอาหาร (NG feeding) ของ โรงพยาบาลสตูล 2552 (ฉบับที่17/11/2552)

ลำดับ	ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปแบบยา/เหตุผล	แนวทางแก้ไข / ยาตัวเลือกอื่น
1	alfuzosin XL 10 mg	Xatral XL	Prolonged -release tablet	ห้ามให้ยาทางสายอาหาร / ให้ยาตัวอื่นแทน เช่น doxazosin
2	aspirin 60 mg	Aspent-M	enteric coated tablet	จำเป็นต้องใช้เพราะไม่มียาตัวอื่นแทน แนะนำให้ละลายน้ำอย่างน้อย 30 ซีซี
3	aspirin 300 mg	Aspent	enteric coated tablet	
5	felodipine 5 mg	Plendil/Feloten	extended release tablet	ห้ามให้ยาทางสายอาหาร
6	gliclazide MR 30 mg	Diamicron MR	modified release tablet	ห้ามให้ยาทางสายอาหาร / ให้ยาเบาหวานตัวอื่นแทน
7	indapamide 1.25 mg	Natrilix SR	sustained release tablet	ห้ามให้ยาทางสายอาหาร
8	isosorbide dinitrate 5 mg SL	Isordil SL	sublingual tablet	ไม่ควรบด สามารถให้ผู้ป่วยอมใต้ลิ้นได้เลย
9	isosorbide mononitrate 60 mg	Imdur	sustained release tablet	ห้ามให้ยาทางสายอาหาร / ใช้ ISDN 10 mg แทน
10	metamucil	Mucillin	จับตัวกับ semisolid&มีความหนืด เมื่อผสมกับน้ำ ทำให้อุดตันสาย	พิจารณายาระบายชนิดอื่น
11	nifedipine SR 20 mg	Nifelat R	sustained release tablet	ไม่ควรให้ ใช้ยากลุ่มอื่นแทน/ใช้ Nifedipine 10 mg แทน
12	orphenadrine 100 mg	Norflex	slow release tablet	ไม่ควรให้ ใช้ tolperisone แทน
13	phenytoin 100 mg cap	Dilantin/Utoin	extended release tablet และยาจับกับ feeding tube	ห้ามให้ / 1.ให้ Phenytoin inj. หรือ phenobarb แทน 2.ให้ phenytoin 50 mg แทน แบ่งให้เป็น 3 มื้อ และก่อน/หลังให้ยา ควรเว้นจากมื้ออาหาร 2 ชม.และควรให้น้ำก่อนและหลังให้ยา
14	sodium valproate 500 mg	Depakine chrono	slow release tablet	ห้ามให้ยาทางสายอาหาร / ใช้Depakine Syr.แทน
15	theophylline 200 mg	Nuelin SR	controlled release tablet	ห้ามให้ยาทางสายอาหาร / ใช้ aminophylline 100 mg แทน
16	Venlafaxine 75 mg cap	Efexor-XR	extended release tablet	ห้ามให้ยาทางสายอาหาร
ยาที่มีเทคนิคพิเศษในการบริหารทางสายอาหาร				
1	esomeprazole 40 mg/lansoprazole FDT	Nexium/Prevacid FDT	enteric coated pellet	หักเม็ดยาละลายน้ำสะอาด และ บริหารยาได้เลย
2	omeprazole 20 mg	Miracid	enteric coated pellet	เปิด capsule เทยาผสมกับน้ำส้ม รีบ feed ทันที โดยห้ามบด pellet
3	ยาเคมีบำบัดชนิดเม็ด	Methotrexate, Cyclophosphamide	ควรหลีกเลี่ยงการบด หากจำเป็นต้องบดเม็ดยา ควรนำเม็ดยาใส่ถุงพลาสติก ปิดให้สนิทแล้วใช้ช้อนบดโดยระวังไม่ให้ถุงแตก	

เอกสารอ้างอิง 1. ชลลดา โสภารัตน์. ยาที่ห้ามบด เคี้ยว หรือทำให้เม็ดยาแตก และการให้ยาทางสายอาหาร : วิชา นิติสารนทร์,ปริชา มนทการดิกุล และสุวิธนา จุฬารัตนพล,
บรรณาธิการ. คู่มือการใช้ยาสำหรับบุคลากรสาธารณสุข. กรุงเทพฯ: สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล; พศ.2549: หน้า 155-167 2. เอกสารกำกับยา

จัดทำโดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านยา จากเภสัชสนเทศ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสตูล Tel. 641