

## Food Drug interaction ที่พบบ่อย รพ.สตูล 2550

ตัวยา	อาหารที่เกิด interaction	แนวทางบริหารยา
Al(OH) <sub>3</sub> +Mg(OH) <sub>2</sub> ,Antacid	ให้แยกให้กับ Fe <sup>2+</sup>	หลังอาหาร 2 ชม. หรือ เวลาท้องว่าง
Doxycycline	นม calcium Mg เกลือแร่เสริม หรือ MTV	กินห่างกัน 2-4 ชม.
Fe	นม ชา กาแฟ ถั่วเหลือง ไข่	ไม่กินร่วมกัน
Fluoroquinolone	นม โยเกิร์ต ยาลดกรด Ca <sup>2+</sup> Fe <sup>2+</sup> Mg <sup>2+</sup>	กินยาก่อน 2 ชม. หรือ กินยาหลัง 4-6 ชม.
Itraconazole	Ca <sup>2+</sup> Mg <sup>2+</sup>	กินห่างกัน 2-4 ชม.
Ketoconazole	- Ca <sup>2+</sup> ,Mg <sup>2+</sup> - alcohol	- กินห่างกัน 2-4 ชม. - สามารถทำให้เกิด disulfuram like effect
Levothyroxine	Fe <sup>2+</sup>	กินห่างกัน 4 ชม.
Metformin	alcohol	ห้ามเนื่องจากเพิ่ม lactic acidosis
Valproic acid	นม	ไม่กินร่วมกัน
Sucralfate	อาหารทำให้ยาออกฤทธิ์ไม่ดี	กินก่อนอาหารเพื่อให้ยาเคลือบกระเพาะ
Tetracycline	นม calcium Mg <sup>2+</sup> Fe <sup>2+</sup>	กินยาหลัง 2 ชม. หรือเวลาท้องว่าง

ยาที่ห้ามกินร่วมกับ Grapefruit juice

↳ Amlodipine , Felodipine , Midazolam , Nifedipine , Nifedipine SR , Verapamil , Warfarin

